

## آمادگی قبل از آندوسکوپی





از ۱۰ ساعت قبل از آندوسکوپی هیچ گونه غذای جامدی مصرف نکنید. مصرف آب قند و چای شیرین تا ۴ ساعت قبل از آندوسکوپی ممانعی ندارد. از ۴ ساعت قبل از آندوسکوپی تا زمان عمل کاملاً ناشتا باشید.

وجود غذا در دستگاه گوارش، مشاهده دقیق داخل مجرای گوارش و معده را دشوار می‌سازد و همچنین امکان وارد شدن ترکیبات درون معده به ریه‌ها در حین عمل دم وجود دارد. اگر شما ناشتای کامل نباشید عمل شما به روز دیگر موکول خواهد شد.

**تذکرات مهم:**

در صورت مصرف قرص آسپرین، وارفارین، هپارین، پلاویکس، اسویکس، آنکساپرین و یا سایر داروهای ضد انعقاد خون، حتماً در زمان تعیین وقت، همکاران ما را مطلع نمایید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.

در صورتی که فرد مبتلا به بیماری فشارخون و یا قند (دیابت) است در زمان تعیین وقت، باید اطلاع دهد تا راهنمایی لازم را دریافت نماید.

در صورتی که به بیماری‌های مثل هپاتیت یا ایندز مبتلا هستید، حتماً پیش از انجام آندوسکوپی این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید. چرا که پزشکان به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری‌های از یک فرد به فرد دیگر، برای مبتلایان به این بیماری‌ها از آندوسکوپ‌های مخصوص این بیماران استفاده می‌کنند.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قلبی داشتن مجوز از پزشک معالج قلب ضروری است.

اگر بیمار، به هر دلیل، دارویی مصرف می‌کند پزشک و پرستار را در جریان بگذارید.

از زمان پذیرش تا زمان دریافت پاسخ حدود ۴ ساعت طول می‌کشد. لطفاً وقت خود و همراهانتان را تنظیم نمایید.

پس از انجام آندوسکوپی، اگر بیمار دچار هر مشکلی نظیر خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شد، هر چه سریع‌تر مساله را با پزشک خود در میان بگذارد.

حضور یک نفر همراه بیمار و مدارک پزشکی هنگام مراجعه الزامی است.

بعد از انجام آندوسکوپی رانندگی ممنوع است.

در صورتی که باردار هستید، اطلاع دهید.

از به همراه آوردن طلا و اشیای قیمتی جدا خودداری کنید

در صورت عدم تمایل به حضور حتماً یک روز قبل از طریق تلفن‌های کلینیک اطلاع دهید تا حتی الامکان بیماران دیگر جایگزین گردند.